



TITLE:

8.単分散ラテックスにおける規則構造形成の理論(大阪大学基礎工学研究科物理系専攻物性学分野,修士論文アブストラクト(1984年度))

AUTHOR(S):

佐野, 央一

CITATION:

佐野, 央一. 8.単分散ラテックスにおける規則構造形成の理論(大阪大学基礎工学研究科物理系専攻物性学分野,修士論文アブストラクト(1984年度)). 物性研究 1985, 44(4): 702-702

ISSUE DATE:

1985-07-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/91665>

RIGHT:

後のアンビル先端には塑性変形が認められず、より高い圧力の発生が可能と思われる。

一方このような圧力領域での物質合成のために高温を同時に発生する技術の改良に努め、1) 黒鉛をヒーター兼圧力媒体として用いる。2) 焼結ダイヤモンド自身をヒーターとして用いる。の2種の方法により、今まで困難であった試料の回収が確実にできるようになった。そこで SiO_2 の高圧相を探るために石英を出発物質として超高压高温合成実験を行ない、1) ではスティショバイトを、2) では Fe_2N 型に類似した粉末回折パターンを与える試料をそれぞれ回収した。

8. 単分散ラテックスにおける規則構造形成の理論

佐野 央 一

適当な条件下にある電解質溶液中に、直径数百～数千Åの単一種類の高分子荷電粒を分散させると iridescence と呼ばれるオパールのような虹彩を示すことが知られている。この粒子はラテックスと呼ばれ、表面電荷は $10^3 \sim 10^5 e$ のものが多い。この現象は分光学的研究により、粒子が fcc 格子を組んでいる事による可視光の Bragg 反射であると結論されたが、その理論は未だ確立していない。

ラテックス粒子の虹彩は、初めコロイド物理の立場から DLVO 理論によって説明されると思われていたが、ラテックスに対してこの理論は、van der Waals 力が小さく溶液の濃度が低い事より斥力が大きくなり、粒子間の引力を導出できなかった。そこで蓮氏はラテックスの秩序化が Kirkwood-Alder 転移によるものであると考え、その相転移や秩序・無秩序共存状態などに対して説明を行った。しかし、実際の秩序相において全く引力が作用していないとは考えにくく、実験でも最近の伊勢氏の研究によれば、秩序状態における粒子間距離は許され得る最大の距離より小さく、凝集している事がわかった。

そこで本研究ではラテックスに格子を組ませた状態でイオン分布を求め、その系のエネルギーを計算した。ラテックス粒子を金属原子核、イオンを電子と見れば、金属中の原子系と極めて似た関係にある事がわかる。これより電子論で使用されている手法を用いて、秩序相における格子間距離と系のエネルギーの関係を求めた。その結果、秩序相では粒子間に引力が存在する事がわかり、ラテックスの秩序形成を説明する事に成功した。